



## **Arzneimittel**

# **Franzbranntwein**

## **mit Campher**

**Wirkstoffe: 2,0 g Campher und 48,2 g Ethanol 96 % (V/V) / 100 g**

**Lösung zum Einreiben der Haut für Erwachsene, Jugendliche und Kinder ab 2 Jahren**

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.**

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder sogar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

### **Was in dieser Packungsbeilage steht:**

1. Was ist Franzbranntwein und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Franzbranntwein beachten?
3. Wie ist Franzbranntwein anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Franzbranntwein aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

### **1. WAS IST FRANZBRANTWEIN UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?**

Franzbranntwein ist eine Lösung zum Einreiben der Haut zum Vorbeugen bei Gefahr des Wundliegens und bei mangelhafter Hautdurchblutung. Zur Unterstützung bei der Therapie von Zerrungen und Prellungen, Verstauchungen sowie Muskel- und Gelenkschmerzen.

### **2. WAS SOLLTEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON FRANZBRANTWEIN BEACHTEN?**

#### **Franzbranntwein darf nicht angewendet werden:**

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Campher, Ethanol, Latschenkieferöl, Citronenöl, Rosmarinöl, Lavendelöl und Citronellöl, Limonene, Linalool, Geraniol, Citronellol, Citral, Eugenol, Farnesol oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.
- bei offenen Hautwunden
- bei Säuglingen und Kleinkindern unter 2 Jahren (Gefahr eines Kehlkopfkrampfes)
- bei Patienten mit Bronchialasthma oder anderen Atemwegserkrankungen, die mit einer ausgeprägten Überempfindlichkeit der Atemwege einhergehen. Die Inhalation von Campher kann zu Atemnot führen oder einen Asthmaanfall auslösen.

#### **Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen:**

Hinweise:

- Nur zur äußerlichen Anwendung.
- Vor Feuer schützen.
- Gut verschlossen aufbewahren.

#### **Bei Anwendung von Franzbranntwein mit anderen Arzneimitteln:**

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln sind nicht bekannt.

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen/angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen/anzuwenden.

#### **Schwangerschaft und Stillzeit:**

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

#### **Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen:**

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

### **Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Franzbranntwein:**

Dieses Arzneimittel enthält Duftstoffe (Latschenkiefernöl, Citronenöl, Rosmarinöl, Lavendelöl und Citronellöl) mit Limonene, Linalool, Geraniol, Citronellol, Citral, Eugenol und Farnesol. Diese können allergische Reaktionen hervorrufen.

### **3. WIE IST FRANZBRANNTWEIN ANZUWENDEN?**

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Nur zur äußerlichen Anwendung.

Die empfohlene Dosis beträgt:

Franzbranntwein wird einmal bis mehrmals täglich auf die betroffenen Körperstellen aufgetragen und bis zur Trockne in die Haut einmassiert. Verwenden Sie keine Umschläge, Verbände oder Abdeckungen.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von Franzbranntwein zu stark oder zu schwach ist. Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

### **4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?**

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

#### **Mögliche Nebenwirkungen:**

- Hautreizungen durch Austrocknen bei längerer Anwendung.
- Bei entsprechend sensibilisierten Patienten können durch Campher, Latschenkiefernöl, Citronenöl, Rosmarinöl, Lavendelöl und Citronellöl Überempfindlichkeitsreaktionen (einschließlich Atemnot) ausgelöst werden.
- Campher, Latschenkiefernöl, Citronenöl, Rosmarinöl, Lavendelöl und Citronellöl können bei Säuglingen und Kindern bis zu 2 Jahren einen Kehlkopfkrampf hervorrufen mit der Folge schwerer Atemstörungen.
- Limonene, Linalool, Geraniol, Citronellol, Citral, Eugenol und Farnesol können allergische Reaktionen hervorrufen.

Die Häufigkeit dieser Nebenwirkungen ist auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar.

#### **Meldung von Nebenwirkungen:**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, 53175 Bonn, Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de) anzeigen.

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

### **5. WIE IST FRANZBRANNTWEIN AUFZUBEWAHREN?**

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Etikett und dem Umkarton nach „Verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

#### **Hinweise:**

Vor Feuer schützen!

Gut verschlossen aufbewahren.

Entsorgen Sie Arzneimittel niemals über das Abwasser (z.B. nicht über die Toilette oder das Waschbecken). Fragen Sie in Ihrer Apotheke, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei. Weitere Informationen finden Sie unter [www.bfarm.de/arzneimittelsorgung](http://www.bfarm.de/arzneimittelsorgung).

### **6. INHALT DER PACKUNG UND WEITERE INFORMATIONEN**

#### **Was Franzbranntwein enthält:**

- Die Wirkstoffe sind: 2,0 g Campher und 48,2 g Ethanol 96% (V/V) / 100 g.
- Die sonstigen Bestandteile sind: Latschenkiefernöl, Citronenöl, Rosmarinöl, Lavendelöl, Citronellöl, Gereinigtes Wasser.

#### **Wie Franzbranntwein aussieht und Inhalt der Packung:**

Franzbranntwein ist eine klare bis sehr schwach opaleszierende Flüssigkeit. Franzbranntwein ist in der Packungsgröße zu 500 ml erhältlich.

#### **Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:**

Pharma Aldenhoven GmbH & Co. KG  
Industriestraße 6  
52457 Aldenhoven

**Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im November 2020.**