



# Galle- und Verdauungskapsel 400 mg mit Artischocke

## Hartkapsel zur Anwendung bei Erwachsenen und Heranwachsenden ab 12 Jahren

Wirkstoff: Artischockenblätter-Trockenextrakt

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Galle- und Verdauungskapsel 400 mg mit Artischocke jedoch vorschriftsmäßig eingenommen werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder nach einer Woche keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

### Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Galle- und Verdauungskapsel 400 mg mit Artischocke und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Galle- und Verdauungskapsel 400 mg mit Artischocke beachten?
3. Wie ist Galle- und Verdauungskapsel 400 mg mit Artischocke einzunehmen?
4. Wie ist Galle- und Verdauungskapsel 400 mg mit Artischocke aufzubewahren?
5. Weitere Informationen

### 1. WAS IST GALLE- UND VERDAUUNGSKAPSEL 400 MG MIT ARTISCHOCKE UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

Galle- und Verdauungskapsel 400 mg mit Artischocke ist ein pflanzliches Arzneimittel zur Anwendung bei Verdauungsbeschwerden.

### Anwendungsgebiet:

Verdauungsbeschwerden (dyspeptische Beschwerden), besonders bei funktionellen Störungen des ableitenden Gallensystems.

Bei Beschwerden, die länger als eine Woche andauern oder periodisch wiederkehren, sollte, wie bei allen unklaren Beschwerden, ein Arzt aufgesucht werden.

### 2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER EINNAHME VON GALLE- UND VERDAUUNGSKAPSEL 400 MG MIT ARTISCHOCKE BEACHTEN?

Galle- und Verdauungskapsel 400 mg mit Artischocke darf nicht angewendet werden, wenn Sie:

- überempfindlich (allergisch) gegen Artischocken und/oder andere Korbblütler oder einen der sonstigen Bestandteile des Arzneimittels sind
- bei Verschluss der Gallenwege

### Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Galle- und Verdauungskapsel 400 mg mit Artischocke ist erforderlich:

Galle- und Verdauungskapsel 400 mg mit Artischocke soll bei Gallensteinleiden nur nach Rücksprache mit einem Arzt eingenommen werden.

Patienten, die Galle- und Verdauungskapsel 400 mg mit Artischocke und gleichzeitig blutgerinnungshemmende Arzneimittel vom Cumarin-Typ (Phenprocoumon, Warfarin) einnehmen wollen, sollten ihren Arzt aufsuchen, da es notwendig sein kann, dass die Dosierung dieser Arzneimittel angepasst werden muss (s. Abschnitt „Bei Einnahme von Galle- und Verdauungskapsel 400 mg mit Artischocke mit anderen Arzneimitteln.“).

### Kinder:

Wegen der nicht ausreichenden vorliegenden Erfahrung mit diesem Arzneimittel bei Kindern soll das Arzneimittel nicht bei Kindern unter 12 Jahren angewendet werden.

### Bei Einnahme von Galle- und Verdauungskapsel 400 mg mit Artischocke mit anderen Arzneimitteln:

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen bzw. vor kurzem eingenommen haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

### Abschwächung der Wirkung:

Bei gleichzeitiger Gabe von Galle- und Verdauungskapsel 400 mg mit Artischocke kann die Wirksamkeit von blutgerinnungshemmenden Mitteln vom Cumarin-Typ (Phenprocoumon, Warfarin) abgeschwächt sein (s. Abschnitt „Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Galle- und Verdauungskapsel 400 mg mit Artischocke ist erforderlich.“).

### Schwangerschaft und Stillzeit:

Galle- und Verdauungskapsel 400 mg mit Artischocke soll wegen nicht ausreichender Untersuchungen in Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.

Fragen Sie grundsätzlich vor der Einnahme von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

### Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen:

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

### Wichtige Information über bestimmte sonstige Bestandteile von Galle- und Verdauungskapsel 400 mg mit Artischocke:

Dieses Arzneimittel enthält Lactose. Bitte nehmen Sie Galle- und Verdauungskapsel 400 mg mit Artischocke daher erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

### 3. WIE IST GALLE- UND VERDAUUNGSKAPSEL 400 MG MIT ARTISCHOCKE EINZUNEHMEN?

Nehmen Sie Galle- und Verdauungskapsel 400 mg mit Artischocke immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein.

Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

### Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:

Erwachsene und Heranwachsende ab 12 Jahren nehmen 3-mal täglich 1 Kapsel Galle- und Verdauungskapsel 400 mg mit Artischocke unzerkaut vor den Hauptmahlzeiten mit ausreichend Flüssigkeit (vorzugsweise ein Glas Wasser) ein.

Die Anwendungsdauer ist nicht grundsätzlich begrenzt, richtet sich aber nach dem Verlauf der Beschwerden. Beachten Sie bitte insbesondere die Angaben unter „Was müssen Sie vor der Einnahme von Galle- und Verdauungskapsel 400 mg mit Artischocke beachten?“

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von Galle- und Verdauungskapsel 400 mg mit Artischocke zu stark oder zu schwach ist.

**Wenn Sie eine größere Menge Galle- und Verdauungskapsel 400 mg mit Artischocke eingenommen haben, als Sie sollten:**

Vergiftungen mit Zubereitungen aus Artischockenblättern sind bisher nicht bekannt geworden.

Bei Einnahme größerer Mengen von Galle- und Verdauungskapsel 400 mg mit Artischocke sollte ein Arzt benachrichtigt werden, der über gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen entscheiden kann.

Möglicherweise treten die unten aufgeführten Nebenwirkungen verstärkt auf.

**Wenn Sie die Einnahme von Galle- und Verdauungskapsel 400 mg mit Artischocke vergessen haben:**

Wenn Sie zu wenig von Galle- und Verdauungskapsel 400 mg mit Artischocke genommen haben oder die Einnahme von Galle- und Verdauungskapsel 400 mg mit Artischocke vergessen haben, nehmen Sie beim nächsten Mal nicht etwa die doppelte Menge ein, sondern fahren Sie mit der Einnahme, wie von Ihrem Arzt verordnet oder in der Gebrauchsinformation beschrieben, fort.

**Wenn Sie die Einnahme von Galle- und Verdauungskapsel 400 mg mit Artischocke abbrechen:**

Die Verdauungsstörungen können wieder auftreten, deshalb sollten Sie Ihren Arzt informieren.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

**4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?**

Wie alle Arzneimittel kann Galle- und Verdauungskapsel 400 mg mit Artischocke Nebenwirkungen haben, die nicht bei jedem auftreten müssen.

Bei der Anwendung von artischockehaltigen Arzneimitteln sind Fälle von leichten Durchfällen mit typischer Begleitsymptomatik (z. B. Bauchkrämpfe), Oberbauchbeschwerden, Übelkeit und Sodbrennen sowie Überempfindlichkeitsreaktionen, wie z. B. Hautausschläge, aufgetreten.

Über die Häufigkeit dieser möglichen Nebenwirkungen liegen keine Angaben vor.

**Meldung von Nebenwirkungen:**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de) anzeigen.

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

**Gegenmaßnahmen bei Nebenwirkungen:**

Sollten Sie eine der oben genannten Nebenwirkungen bei sich beobachten, so informieren Sie einen Arzt, damit er über den Schweregrad und über gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen entscheiden kann.

Bei den ersten Anzeichen einer Überempfindlichkeitsreaktion darf Galle- und Verdauungskapsel 400 mg mit Artischocke nicht nochmals eingenommen werden.

**5. WIE IST GALLE- UND VERDAUUNGSKAPSEL 400 MG MIT ARTISCHOCKE AUFZUBEWAHREN?**

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Blister bzw. Faltschachtel nach „verwendbar bis:“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

**Aufbewahrungsbedingungen:**

Nicht über 30 °C lagern.

**6. WEITERE INFORMATIONEN**

**Was Galle- und Verdauungskapsel 400 mg mit Artischocke enthält:**

Der Wirkstoff ist: Artischockenblätter-Trockenextrakt

1 Hartkapsel enthält:

400 mg Trockenextrakt aus Artischockenblättern (4-6 : 1)

Auszugsmittel: Wasser

Die sonstigen Bestandteile sind:

Talkum, Magnesiumstearat (Ph.Eur.), Hochdisperses Siliciumdioxid, Maisstärke, Lactose-Monohydrat, Gelatine, Gereinigtes Wasser, Natriumdodecylsulfat, Titandioxid (E 171), Eisen(III)-oxid (E 172), Eisenoxidhydrat (E 172), Chlorophyll- und Chlorophyllin-Kupfer-Komplex (E 141).

**Wie Galle- und Verdauungskapsel 400 mg mit Artischocke aussieht und Inhalt der Packung:**

Galle- und Verdauungskapsel 400 mg mit Artischocke ist eine zweifarbige undurchsichtige Hartkapsel (das Kapseloberteil ist grün und das Kapselunterteil rotbraun) und in Packungen mit 60 Hartkapseln erhältlich.

Pharmazeutischer Unternehmer: Euro Vital Pharma GmbH, Borsteler Chaussee 49, 22453 Hamburg.

Hersteller: Euro Vital Pharma GmbH, Elisabeth-Schumacher-Str. 54-56, 04328 Leipzig.

Zulassungsinhaber: Aenova IP GmbH, Temmlerstr. 2, 35039 Marburg.

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt im November 2016 überarbeitet.